



PLANTEBESKYTTELSE

2024





PLANTEVÆRN - RAMMEAFTALE

HVORFOR 'DANMARKS BEDSTE AFTALE'?

Hornslyd Købmandsgaard A/S har igennem en årrække med stor succes tegnet "rammeaftaler" på plantebeskyttelse.

Dette skyldes den store fleksibilitet, der er ved aftalen. Vi er en del af et af Europas største indkøb, hvilket betyder, at vi kan tilbyde plantebeskyttelse til konkurrencedygtige priser.

Vi prioriterer meget højt, at den relevante rådgivning følger med ved køb af planteværn. Det er nemlig

DERUDOVER FÅR DU:

- Betaling 12. august 2024
- Årsbonus krediteres i juli 2024
- Mulighed for justering af sprøjteplanen hvis alternative midler er billigere
- Ugentlig opdatering af afgrøderne i vækstsæsonen gennem MarkNyt, som sendes på e-mail
- Fri levering af hovedordre og suppleringsordrer (*dag til dag levering ved bestilling inden kl. 10.00*)
- Lokale lagre med bredt sortiment til løbende afhentning
- Adgang til kampagnevarer og "spotpartier"
- Håndbog med relevante planteværnsstrategier
- Automatisk udsendelse af leverandørbrugsanvisninger
- Fuld returret leveret til HK lager indtil 28. juni 2024 (*dog ikke produkter der udfases enten på EU- eller landsplan, samt produkter med orange faresymboler*)

ikke ligegyldigt hvilket middel, der benyttes mod den enkelte skadegører og i hvilken dosis. Faktisk udgør disse to faktorer hele 50 % af effekten i marken, imens timingen udgør 20 % af effekten. Mindre effekt i marken kan hurtigt koste toppen af udbyttet, hvilket i sidste ende har stor betydning for bundlinjens resultat.

For at optimere din bedrift tilbyder vi løbende faglig sparring med en planteavlsspecialist.

VIL DU HAVE DEL I DE GODE VILKÅR?

- ring til os på tlf. 75 68 73 00

INDHOLDSFORTEGNELSE

Bemærk! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette! - også vedrørende maks. doser i forhold til udviklingsstadier.

VINTERSÆD	4-11
Ukrudt vintersæd	4
Vinterhvede	7
Vinterbyg	8
Triticale	9
Vinterrug	9
Vintersæd Efterår	11
VÅRSÆD	13-17
Vårbyg	13
Vårhvede	15
Havre	17
MANGELSYGDOMME I KORN	19
GRÆSMARKER OG FRØGRÆS	20-21
MAJS	22
ÆRTER OG HESTEBØNNER	23-24
RAPS	26-27
BEDEROER	28
KARTOFLER	30-31
SKOVBRUG M.M.	32
SKOVBRUG M.M.	33
BESTILLINGSLISTE	34-35
EFFEKTABEL UKRUDT	36-37
EFFEKTABEL SVAMPE I KORN	38-39
UDVIKLINGSSTADIER FOR AFGRØDER	40-41
SPRØJTETEKNIK	42
TRIAZOLREGLER	43
KONTAKT	44

VINTERSÆD

Vinterhvede, Vinterrug, Triticale - Græsbekæmpelse forår (ikke efterårsbehandlede marker)

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Alm. og enårig rapgræs, rajgræs, vindaks og bredbladet ukrudt inkl. stedmoder, ærenpris og hyrdetaske	Cossack OD + Renol/Mero Olie + DFF/Sempra	0,7 ltr. + 0,5 ltr. + 60 ml	23-32	Anvend maks. 0,6 ltr. Cossack i vinterrug. DFF tilsættes ved mange stedmoder og ærenpris senest i stadie 28.
Vindaks, alm. rapgræs, rajgræs, kamille, burresnerre, pileurt, storkenæb og tvetand	Rexade 440 + PG 26N	37,5-50 g + 0,5 ltr.	23-32	
Agerrævehale, alm. rapgræs, enårig rapgræs, fuglegræs, kamille, rajgræs, raps, vindaks	Atlantis OD	0,9 ltr.	13-32	Anvend maks. 0,45 ltr. Atlantis OD i vinterrug og senest i stadie 30. Tilsæt evt. 0,4 ltr. Zyper mod meget bredbladet ukrudt.
Alm. og enårig rapgræs, rajgræs, gold hejre og agerrævehale samt bredbladet ukrudt*	Rexade + Atlantis OD + PG 26N	37,5 g + 0,3 ltr. + 0,5 ltr.	30-32	Atlantis OD forstærker på enårig rapgræs. Tilsæt evt. 8-10 kg N.
Problemgræsser i tidlig hvede: rajgræs, agerrævehale, alm. og enårig rapgræs*	Broadway + Cossack OD + PG 26N	130 g + 0,5 ltr. + 0,5 ltr.	23-32	
Sen opfølgning	Broadway + PG 26N	130-220 g + 0,5 ltr.	23-39	Gold hejre skal splitbehandles med 2x110 g Broadway + 0,5 ltr. PG 26N pr. ha. med 10-14 dages mellemrum. Maks. dosis på 220 g Broadway fra stadie 33.
Rajgræs, enårig rapgræs, vindaks og bredbladet ukrudt	Hussar Plus OD + Renol/Mero Olie + DFF/Sempra	110-140 ml + 0,5 ltr. + 60 ml	23-32	Velegnet som sen opfølgning i rug.

Ved tidlig vækst og god temperatur kan 0,5 ltr. CCC/Trece tilsættes.

* Ikke i Rug.

Vinterbyg - Græsbekæmpelse forår

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Rajgræs, enårig rapgræs, vindaks og bredbladet ukrudt	Hussar Plus OD + Renol/Mero Olie + DFF/Sempra	50 ml + 0,5 ltr. + 50 ml	23-30	En meget tidlig kørsel er nødvendig for tilfredsstillende effekt på græsser. Rajgræs bør behandles FØR 1. april. Ved forekomst af stedmoder og ærenpris tilsættes DFF senest i stadie 28.

VINTERSÆD

Vintersæd - Ukrudtbekæmpelse forår (efterårsbehandlede marker)				
Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Bredbladet ukrudt inkl. storkenæb og hejrenæb samt lægejordrøg + resistente arter	Zypar	0,5-1,0 ltr.	30-37	Temperatur fra 2°C. I vinterbyg ikke senere end stadie 30.
Bredbladet ukrudt inkl. burresnerre, kamille og snerlepileurt	Starane XL + Express Gold 33 SX	0,4 ltr. + 9 g	30-37	Behandl ikke vinterbyg senere end stadie 30. Temperatur fra 12°C. Meget bred løsning.
Bredbladet ukrudt inkl. burresnerre, kamille og snerlepileurt, hvidmelet gåsefod, storkenæb, tidsler, bynke, padderok	Mustang Forte	0,5-1,0 ltr.	30-32	Se etiketten vedr. efterfølgende afgrøder og anvendelse af halm.
Burresnerre og pileurter	Starane 333 HL	0,36 ltr.	30-45	Kan behandles, når der er god vækst i ukrudtet i foråret (min. 12°C).
Tidsel, agerpadderokke, grå bynke og kornblomst	U46 M/MCPA + Nuance Max 75 WG	1,0 ltr. + 7,5 g	30-39	Temperaturen skal være min. 12-15°C. Min. vandmængde på 200-250 ltr. pr. ha. Udkøres senest 1. august.
Rajgræs, alm. og enårig rapgræs, hejre, vindaks og bredbladet ukrudt	Cossack OD + Renol/Mero Olie *	0,5-0,75 ltr. + 0,5 ltr.	21-32	Cossack OD er ikke godkendt i vinterbyg og må kun anvendes med maks. 0,6 ltr. i vinterrug. Tilsæt 0,1 ltr. Zypar pr. ha. ved store burresnerrer.
Agerrævehale og væselhale	Atlantis OD *	0,9 ltr.	21-32	Anvendes ikke i vinterbyg. Maks. 0,45 ltr. i vinterrug. Tilsæt evt. 8-10 kg N.
Rajgræs, alm. og enårig rapgræs, hejrearter, vindaks og bredbladet ukrudt	Broadway + PG 26N *	165 g + 0,5 ltr.	30-39	Anvendes ikke i vinterbyg. Ved enårig rapgræs tilsættes 0,3-0,4 ltr. Atlantis pr. ha. Gold hejre skal splitbehandles med 110 g Broadway og 30 g Rexaede + 0,5 ltr. PG 26N pr. ha. med 10-14 dages mellemrum.
Ved meget bredbladet ukrudt	Rexade + PG 26N *	37-50 g + 0,5 ltr.	30-39	
Opfølgning rævehale, rajgræs, vindaks og flyvehavre	Topik EC + Renol/Mero Olie	0,3-0,4 ltr. + 0,5 ltr.	13-39	Anvendes, hvor der er anvendt Atlantis OD i efteråret. Er bedst på små græsser. Anvendes ikke i vinterbyg.
Flyvehavre samt opfølgning på vindaks	Foxtrot + Contact	0,8-1,0 ltr. + 0,2 ltr.	25-30	Udkøres ikke ved temperaturer under 12°C. Senest stadie 39 i vinterhvede.

* Ved tidlig vækst og god temperatur kan 0,5 ltr. CCC/Trece tilsættes i vinterhvede og rug.

Balaya®

Svampemiddel

0,75-1,0 L/ha på fanebladet st. 39

Booster dit udbytte

- ❖ Suverænt stærkeste septoria bekæmpelse
- ❖ Stærk kurativ - og langtidseffekt
- ❖ Anvend alene for maksimal Septoria effekt



BASF
We create chemistry

*Dosering afhængig af smittetryk og modtagelighed.

Landsforsøg 090822121 viser højeste nettoudbytte ved 0,75 l/ha Balaya® i stadie 37-39 I mindre modtagelige vinterhvedesorter. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet for anvendelse. Medlem af Dansk Planteværn.

VINTERSÆD

Vinterhvede - Vækstregulering, svampe og skadedyr					
Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Vækstregulering	Lejesæd	Trece 750/CCC + Sonis/Cuadro NT	0,5-1,0 ltr. + 0,2 ltr.	30	Afgrøden skal være i god vækst. Kun Trece/CCC kan kombineres med ukrudts-sprøjtningen. Max 0,5 ltr. Trece/CCC.
		Sonis/Cuadro NT	0,4 ltr.	30-39	Afgrøden skal være i god vækst.
		Medax Top + Kvikup	0,75 ltr. + 0,75 ltr.	31-33	Følg op på behandling med Trece. Hvis svampemiddel iblandes, reduceres dosen på vækstregulering med 25 %.
		Cerone + Sonis/Cuadro NT + Contact	0,4 ltr. + 0,2 ltr. + 0,15 ltr.	33-39	
Svampe T0 Tidlig sprøjtning*	Meldug	Talius EC	0,2 ltr.	30	
	Rust	Comet Pro	0,2 ltr.	30	
Svampe T1 Sprøjtning*	Meldug, rust og septoria	Proline Xpert EC 240	0,25 ltr.	32-33	Tilsæt 0,2 ltr. Talius ved konstateret meldug.
Svampe T2 Fanebladssprøjtning*	Rust og septoria	Balaya	0,5-0,8 ltr.	37-40	Sprøjtes på fuldtudviklet faneblad.
Svampe T3 Akssprøjtning*	Rust, septoria og hvedebladplet	Propulse + Orius Gold	0,5 ltr. + 0,25 ltr.	51-55	
Skadedyr	Bladlus	Mavrik	0,15-0,2 ltr.	10-75	Maks. 2 behandlinger om foråret. Der skal være 10-14 dage mellem behandlingerne.
	Hvedegalmyg	Lamdex	0,2 kg		Behandles maks. 3 gange pr. sæson.

* Vær obs på triazolreglerne. Se mere på side 43

VINTERSÆD

Vinterbyg - Vækstregulering, svampe og skadedyr					
Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Vækstregulering	Lejesæd	Terpal	0,5-1,0 ltr.	30-49	Tidlig behandling. Husk tilsætning af spredningsklæbemiddel.
		Sonis/Cuadro NT	0,3-0,6 ltr.	30-39	
	Lejesæd i kraftig gødet afgrøde	Sonis/Cuadro NT	0,3 ltr.	32-33	Kraftig gødet og tidlig sået vinterbyg kan have effekt af en todelt tildeling hhv. sammen med 1. og 2. svampebehandling.
		Cerone	0,5 ltr.	39-49	
	Strå- og aksnedknækning	Cerone	0,15-0,3 ltr.	47-49	Ikke på tørkestressede planter.
Svampe 1. behandling*	Meldug, rust og skoldplet	Folicur Xpert EC 240	0,25 ltr.	33-35	Mod skoldplet foretrækkes Folicur Xpert EC 240.
Svampe 2. behandling*	Meldug, rust og skoldplet	Proline Xpert EC 240 + Comet Pro	0,25 ltr. + 0,2 ltr.	39-55	De 2 nederste løsninger anbefales ved høje udbyttenevauer samt hvor der ønskes beskyttelse mod ramularia.
		Propulse + Comet Pro	0,5 ltr. + 0,2 ltr.	39-55	
		Balaya + Propulse + Comet Pro	0,25 ltr. + 0,25 ltr. + 0,1 ltr.	39-40	
Skadedyr	Kornbladbillens larver og bladlus	Lamdex	0,2 kg		Behandles maks. 3 gange pr. sæson.
	Bladlus	Mavrik	0,15-0,2 ltr. pr. ha.		Følg vejledende bekæmpelsestærskler og udsendte varslinger i sæsonen. Anvend maks. 2 x 0,15 ltr. eller 1 x 0,2 ltr. pr. ha. pr. sæson.

* Vær obs på triazolreglerne. Se mere på side 43

VINTERSÆD

Triticale - Vækstregulering, svampe og skadedyr

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning	
Vækstregulering	Lejesæd	Trece 750/CCC + Sonis/Cuadro NT	0,5-1,0 ltr. + 0,2 ltr.	30-31	Afgrøden skal være i god vækst.
		Medax Top + Kvikup	0,75 ltr. + 0,75 ltr.	30-39	Opfølgning på behandling med Trece. Hvis svampemiddel iblandes, reduceres dosen på vækstregulering med 25 %.
		Cerone + Sonis/Cuadro NT + Contact	0,4 ltr. + 0,2 ltr. + 0,15 ltr.	33-39	
Svampe Tidlig sprøjtning*	Rust	Orius Gold	0,3-0,4 ltr.	30-51	Bør behandles hver 14. dag ved angreb med 0,4 ltr.
Svampe Akssprøjtning*	Septoria og rust	Proline Xpert EC 240 + Comet Pro	0,35 ltr. + 0,2 ltr.	51-55	
Skadedyr	Trips	Lamdex	0,2 kg		Behandles maks. 3 gange pr. sæson.

Vinterrug - Vækstregulering, svampe og skadedyr

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning	
Vækstregulering	Lejesæd	Trece 750/CCC + Sonis/Cuadro NT	1 ltr. + 0,2 ltr.	30-32	Behandles først, når afgrøden er i god vækst. Dog ikke på stressede planter.
		Terpal	0,5-1 ltr.	32-37	Opfølgning på behandling med Trece. Hvis svampemiddel iblandes, reduceres dosen på vækstregulering med 25 %.
		Sonis/Cuadro NT	0,3-0,6 ltr.	30-37	
		Medax Top + Kvikup	0,5-0,75 ltr. + 0,5-0,75 ltr.	30-39	
		Cerone + Sonis/Cuadro NT + Contact	0,4 ltr. + 0,2 ltr. + 0,15 ltr.	33-39	
Svampe Tidlig sprøjtning*	Skoldplet og meldug	Folicur Xpert	0,2 ltr.	30-31	Bekæmpelse iværksættes ved over 35 % angrebne planter i vækststadium 30-31.
Svampe Akssprøjtning*	Brunrust og skoldplet	Proline Xpert EC 240 + Comet Pro	0,3 ltr. + 0,3 ltr.	49-65	
Skadedyr	Trips	Lamdex	0,2 kg		Behandles maks. 3 gange pr. sæson.

* Vær obs på triazolreglerne. Se mere på side 43



PROPULSE®

Ét svampemiddel til dine markplaner
Fra én afgrøde
direkte
til den næste

Hvede

Byg

Kartofler

Raps

Rug

Havre

Majs

Frøgræs

NYHED!

Nu også
godkendt i
frøgræs

// Beskytter mod de vigtigste
svampesygdomme

// Velaftprøvet produkt i
både forsøg og praksis

// Sikrer god nettoøkonomi

// Ét produkt til mange afgrøder

Hør mere hos din konsulent eller læs mere på www.cropscience.bayer.dk



Christian Søndergaard Christensen
2894 3024



Jens-Richardt Thyssen
2810 4611



Klaus Nielsen
2894 2068

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

VINTERSÆD EFTERÅR

Vinterhvede og triticale - Ukrudtsbekæmpelse efterår

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Alm. ukrudtsbestand	Boxer + DFF/Sempra *	1,0-0,2 ltr. + 0,1 ltr.	10-11	Ved græsproblemer skal den højeste dosis Boxer anvendes.
Alm. ukrudtsbestand + storkenæb, valmuer, raps og fuglegræs	Boxer + Mateno Duo *	0,75 ltr. + 0,35 ltr.	10-11	Ved græsproblemer skal den højeste dosis Boxer anvendes.
Alm. ukrudtsbestand: 2-delt strategi 1. behandling	DFF/Sempra eller Mateno Duo	0,15 ltr. 0,35 ltr.	0-11	2-delt strategi anvendes ved tidlig såning eller hvis temperaturen er for høj til Boxer.
Alm. ukrudtsbestand: 2-delt strategi 2. behandling	Boxer *	1,0 ltr.		Opfølgende behandling skal ske ca. 14 dage efter 1. behandling.
Rajgræs og rævehale: 2-delt strategi 1. behandling	DFF/Sempra eller Mateno Duo	0,15 ltr. 0,5 ltr.	0-11	2-delt strategi anvendes ved tidlig såning eller hvis temperaturen er for høj til Boxer.
Rajgræs og rævehale: 2-delt strategi 2. behandling	Boxer + Topik *	1,5 ltr. + 0,2 ltr.		Opfølgende behandling skal ske ca. 14 dage efter 1. behandling.
Opfølgning ved væselhale	Atlantis	0,75 ltr.		Køres ultimo oktober efter behov.
Opfølgning ved rajgræs og rævehale	Topik + Olie	0,2 ltr. + 0,5 ltr.		Der skal kun anvendes olie på græs med maks. to blade.

* Dagstemperaturen skal være under 15 grader, før der må køres Boxer.

Rug og vinterbyg - Ukrudtsbekæmpelse efterår

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Almindelig ukrudtsbestand	Boxer + DFF/Sempra	1,0 ltr. + 0,05 ltr.	10-11	Dagstemperaturen skal under 15 grader, før der må køres Boxer.
Stor ukrudtsbestand 1. behandling	Mateno Duo	0,35 ltr.	11	Der må maksmalt anvendes 0,35 ltr. Mateno Duo i vinterbyg og vinterrug.
Stor ukrudtsbestand 2. behandling	Boxer	1 ltr.		Opfølgende behandling skal ske ca. 14 dage efter 1. behandling.
Vinterbyg med meget græsukrudt	Boxer + DFF/Sempra	2,5 ltr. + 0,05 ltr.	9-11	Dagstemperaturen skal under 15 grader, før der må køres Boxer.



ADAMA

TOPIK® EC

Effektivt ukrudtsmiddel
overfor græsukrudt i
vår- og vinterhvede samt
i vinterrug og triticale



LÆS MERE



Topik kan anvendes med 0,2 l/ha efterår eller 0,4 l/ha forår.

En tidlig indsats mod i særdeleshed rajgræs, agerrævehale, flyvehavre og alm.rapgræs med Topik® EC giver god effekt på græsukrudt og mulighed for opfølgning i foråret - hvis der overhovedet er behov!

Læs mere på adama.com

Hans-Jørgen Hansen, +45 61 10 07 10, hans.hansen@adama.com.
Læs altid etiketten før brug.

 UKRUDTSMIDDEL

Listen - Learn - Deliver

ADAMA.COM

Vårbyg - Ukrudtsbekæmpelse uden udlæg

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Blandet ukrudt inkl. enårig rapgræs før fremspiring	DFF/Sempra	0,1 ltr.	0	Behandles før fremspiring. Bør opfølges efter fremspiring.
Blandet ukrudt inkl. ærenpris og stedmoder	Accurate Max 250 WG + Pixxaro	7 g + 0,25 ltr.	13-31	Alternativt til Accurate Max 250 WG anvendes 2,5-5 g Nuance Max 75 WG, hvis der er mange mælder.
Blandet ukrudt inkl. burresnerre, pileurt, fuglegræs, kornblomst og hejrestorkenæb	Mustang Forte + DFF/Sempra	0,3 - 0,75 ltr. + 30 ml	12-31	Meget bred og billig løsning. Den højeste dosis af Mustang Forte bør anvendes ved bekæmpelse af tidsler. Se etiketten vedr. efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm.
Blandet ukrudt inkl. pileurt og burresnerre	Nuance Max 75 WG + Starane XL	2,5-5 g + 0,3 ltr.	20-39	Tilsæt evt. 30 ml DFF/Sempra.
Blandet ukrudt inkl. rajgræs, enårig rapgræs, pileurt, stedmoder og ærenpris	Hussar Plus OD + DFF/Sempra + Renol Olive	50-70 ml + 40 ml + 0,5 ltr.	13-28	Den bedste effekt på enårig rapgræs opnås, når græsset har 1-3 blade. Anvend den højeste dosis mod vindaks og rajgræs. Hvis Mangan anvendes, så benyt Contact i stedet for olie.
Flyvehavre og vindaks	Foxtrot + Contact	0,8-1,0 ltr. + 0,2 ltr.	14-30	Gerne i udlæg af kløver, rød- og engsvingel samt afgræsnings- og slætgræs.
Tidsel, gråbynke og agerpadderokke	U46 M/MCPA + Contact	1,0 ltr. + 0,2 ltr.	20-39	Behandles senest 1. august. Min. vandmængde på 200-250 ltr. pr. ha.

Vårbyg - Ukrudtsbekæmpelse med græsudlæg

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Blandet ukrudt inkl. enårig rapgræs, før fremspiring	DFF/Sempra	0,1 ltr.	0	Behandles før fremspiring.
Blandet ukrudt inkl. ærenpris og melder	Pixxaro	0,25 ltr.	13-31	Nuance Max WG 75 er godkendt til mindre anvendelse i korn med græsudlæg.
Blandet ukrudt inkl. pileurt og burresnerre	Starane XL	0,3 ltr.	20-39	
Blandet ukrudt inkl. burresnerre, pileurt, fuglegræs, kornblomst og hejrestorkenæb	Mustang Forte	0,3-0,75 ltr.	12-32	Se etikette vedr. efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm. Anvend den højeste dosis ved bekæmpelse af tidsler.
	Starane XL	0,5-1,0 ltr.	30-39	Anvend den højeste dosis ved kornblomst. Anbefalet i stadie 30.
Tidsel, gråbynke og agerpadderokke	U46 M/MCPA + Contact	1,0 ltr. + 0,2 ltr.	20-39	Behandles senest 1. august. Min. vandmængde på 200-250 ltr./ha.

Vårbyg - Ukrudtsbekæmpelse med kløver, græs- og lucerneudlæg

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Blandet ukrudt	Fighter 480 + Renol Olie	1,5 ltr. + 0,5 ltr.	14-30	Temperaturen skal være min. 15°C. Kløveren skal min. have et trekoblet blad og græsfrøet skal være dækket af jord.
Blandet ukrudt inkl. hanekro, ærenpris og korsblomstrede arter	Fighter 480 + Stomp CS	1,0-1,25 ltr. + 1,0 ltr.	14-30	Fighter 480 er mest skånsom mod kløver.
Skadedyr og bladrandbille	Lamdex	0,2 kg		Se efter tidlige angreb under fremspiring samt efter høst af helsæd. Maks. 3 behandlinger pr. sæson.

Vårbyg - Vækstregulering, svampe og skadedyr

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning	
Vækstregulering	Lejesæd	Terpal	0,5-1,0 ltr.	32-37	Dosering afpasses sortens stråstyrke.
		Cuadro NT/Sonis	0,2-0,5 ltr.	30-39	
	Aks- og strånedknækning	Cerone	0,1-0,2 ltr.	39-49	Ikke tørkestressede planter.
Svampe 1. behandling*	Rust og skoldplet	Folicur Xpert EC 240	0,25 ltr.	33-35	Anvend Folicur Xpert EC 240 ved skoldplet og bygbladplet.
Svampe 2. behandling*	Meldug, rust og skoldplet	Proline Xpert EC 240 + Comet Pro	0,25 ltr. + 0,2 ltr.	39-55	Den nederste løsning anbefales ved høje udbytteniveauer.
		Propulse + Comet Pro	0,5 ltr. + 0,2 ltr.		
		Balaya + Propulse + Comet Pro	0,25 ltr. + 0,25 ltr. + 0,1 ltr.		
Skadedyr	Kornbladbillens larve og bladlus	Lamdex	0,2 kg		Behandles maks. 3 gange pr. sæson.

* Vær obs på triazolreglerne. Se mere på side 43

Vårhvede - Ukrudtsbekæmpelse uden udlæg

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Blandet ukrudt inkl. ærenspris og stedmoder	Accurate Max 250 WG + Pixxaro	7 g + 0,25 ltr.	13-31	Alternativt til Accurate Max 250 WG anvendes 5 g Nuance Max 75 WG, hvis der er mange mælder.
Blandet ukrudt inkl. pileurt og burresnerre	Nuance Max 75 WG + Starane XL	2,5-5 g + 0,3 ltr.	20-39	
Blandet ukrudt inkl. enårig rajgræs, pileurt, stedmoder og ærenpris	Hussar Plus OD + DFF/Sempra + Renol Olie	40-70 ml + 40 ml + 0,5 ltr.	13-28	Den bedste effekt på enårig rajgræs opnås, når græsset har 1-3 blade. Anvend den højeste dosis mod vindaks og rajgræs. Kør evt. DFF/Sempra for sig lige efter såning.
Flyvehavre og vindaks	Foxtrot + Contact	0,8-1,0 ltr. + 0,2 ltr.	14-30	
Flyvehavre, vindaks, blandet ukrudt	Rexade + PG 26N	40 g + 0,5 ltr.	21-32	Rexade har effekt på storkenæb og lægejordrøj.
Flyvehavre, vindaks, blandet ukrudt rajgræs og agerrævehale	Broadway + PG 26N	145 g + 0,5 ltr.	20-32	
Blandet ukrudt inkl. burresnerre, pileurt, fuglegræs, kornblomst og hejrestorkenæb	Mustang Forte	0,3-0,75 ltr.	12-32	Se etikette vedr. efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm. Anvend den højeste dosis ved bekæmpelse af tidsler.
	Starane XL	0,5-1,0 ltr.	30-39	Anvend den højeste dosis ved kornblomst.
Tidsel, gråbynke og agerpadderokke	U46 M/MCPA + Contact	1,0 ltr. + 0,2 ltr.	20-39	Behandles senest 1. august. Min. vandmængde på 200-250 ltr. pr. ha.

Vårhvede - Vækstregulering, svampe og skadedyr

Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Vækstregulering	Lejesæd	Trece 750/CCC	0,5-1 ltr.	25-30	
		Cuadro NT/Sonis	0,2-0,4 ltr.	30-39	Maks. 1 behandling pr. sæson.
Tidlig sprøjtning*	Rust	Orius Gold	0,2 ltr.	29-37	
Akssprøjtning*	Septoria og rust	Proline Xpert EC 240 + Comet Pro	0,35 ltr. + 0,3 ltr.	37-59	
Skadedyr	Bygfluer, bladlus, kornbladbillens larver	Lamdex	0,2 kg		Behandles maks. 3 gange pr. sæson.
	Orangegule galmyg	Mavrik	0,15 - 0,2 ltr.	10-75	Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Der skal være 10-14 dage mellem behandlingerne.

* Vær obs på triazolreglerne. Se mere på side 43

Havre - Ukrudtsbekæmpelse uden udlæg

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Blandet ukrudt inkl. pileurt og burresnerre	Nuance Max 75 WG + Starane XL	2,5-5 g + 0,3 ltr.	20-39	Nuance Max 75 WG kan give gulfarvning
Blandet ukrudt inkl. burresnerre, pileurt, fuglegræs, kornblomst og hejrestorkenæb	Mustang Forte	0,3-0,75 ltr.	13-32	Se etikette på Mustang Forte vedr. efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm. Anvend den højeste dosis af Mustang Forte ved bekæmpelse af tidsler.
Tidsel, gråbynke og agerpadderokke	U46 M/MCPA + Contact	1,0 ltr. + 0,2 ltr.	20-39	Min. vandmængde på 200-250 ltr./ha.

Havre - Vækstregulering, svampe og skadedyr

Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning	
Vækstregulering	Trece 750/CCC	1-1,5 ltr.	30-31	Dosering afpasses sortens stråstyrke.	
	Cuadro NT/Sonis	0,3 ltr.	30-34		
Tidlig sprøjtning*	Meldug og rust	Orius Gold	0,2 ltr.	30	Anvend evt. Talius ved meget meldug.
Svampesprøjtning	Meldug, rust og bladplet	Proline Xpert EC 240 + Comet Pro	0,2-0,25 ltr. + 0,2-0,25 ltr.	31-65	
Skadedyr	Bladlus, kornbladbillens larve	Lamdex	0,2 kg		Behandles maks. 3 gange pr. sæson.

* Vær obs på triazolreglerne. Se mere på side 43

Få råd til at dyrke...



syngenta®

Henrik Ryberg
Henrik.ryberg@syngenta.com
30 47 05 64

Besøg
os på
Facebook



Mogens Steenholt Mogensen
Mogens.steenholt.mogensen@syngenta.com
20 12 01 82

TM

MANGELSYGDOMME I KORN

Mangelsygdomme i korn			
Problem	Løsning	Dosis/ha	Bemærkning
Manganmangel (Lyspletsyge)	Profi ManganNO3 + Contact	1,0-2,0 ltr. + 0,2 ltr.	Behandling gentages efter behov. Kan blandes med de fleste svampe og ukrudtsmidler. Se middeldatabasen.
	eller Mangansulfat 32 + Contact	eller 1,0-2,0 kg + 0,2 ltr.	
Svovlmangel (skeformet blad)	Pioner S 80	5 - 10 kg	Behandles ved konstateret behov.
Kobbermangel (gulspidssyge)	Kobberoxyklorid	0,1-1,0 kg	Behandles ved konstateret behov.
	Lebosol Kobber 350	0,75 ltr.	Højkoncentreret flydende kobberprodukt, der kan anvendes både som bladgødningsmiddel og som kobbergødning med jordoptag.
Forebyggelse (N,Mg, Mn, Zn, Cu mangel)	Profi Universal	1,0-2,0 ltr.	Anvend 2 ltr. ved kraftig mangel - gentages 10-14 dage efter. Vandmængde: 100 ltr. pr. ha.
Forebyggelse (Mg, Mn, B, Ca, Mo mangel)	YaraVita Brassitrel Pro	3,0 ltr.	Anbefales at bruge fra stadie 12-31. Vandmængde: 200 ltr. pr. ha.
Magnesium/Svovlmangel	EPSO Top (Magnesiumsulfat/Bittersalt)	25-50 kg	Gentages efter behov.

GRÆSMARKER

Græsmarker - flerårige med/uden kløver

Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
MED kløver	Tokimbladet ukrudt, brandbæger, fuglegræs, kamille, kiddike, agerkål, raps, sennep, storkeæb, melder	Fighter 480 + Renol Olie	2 ltr. + 0,5 ltr.	20-39	Udsprøjtes i foråret på ukrudt i god vækst ved temperatur på min 12°C. Kløveren skal have et 3-koblet blad.
	Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, raps, snerlepileurt	Harmony 50 SX + Contact	15 g + 0,2 ltr.	August	
UDEN kløver	Blandet ukrudt inkl. valmue og kornblomst	Saracen M + Contact	75-150 ml + 0,2 ltr.	20-39	
	Blandet ukrudt inkl. mælkebøtte, skræppe, bandbæger, nælde og afertidsel	Starane XL	1,5-1,8 ltr.	20-39	Behandles senest 14 dage før afgræsning. Udsprøjtes i foråret ved temperatur på min. 12°C.
		Ariane FGS	2-3 ltr.	21-31	Udsprøjtes i foråret ved temperatur på min. 12°C.
MED og UDEN kløver	Eng- og vårbrandbæger, skræppe, ranunkel og røllike	Harmony 50 SX + Contact	30-37,5 g + 0,2 ltr.	juli - august	Behandles på genvækst af ukrudt, når dette har 3-4 blade. Gulfarvning af græs kan forekomme.
Skadedyr	Fritflue	Lamdex	0,4 kg		Max. 1 behandling pr. år.

Græsplæner/græsarealer uden offentlig adgang inkl. private haver (off-label godkendelse)

Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Ukrudt	Tokimbladet ukrudt	Saracen M	0,15 g	Forår til september	Udsprøjtes, når græs og ukrudt er i god vækst med temperaturer over 3°

FRØGRÆS

Frøgræs					
Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Blandet ukrudt inkl. kamille, burrenerre og pileurt		Saracen M + Contact + DFF/Sempra	0,15-0,2 ltr. + 0,2 ltr. + 0,07-0,10 ltr.	20-29	Kan udsprøjtes tidligt fra temperatur på 2°C. Off-label på Sempra.
Opfølgning på rodukudt		Ariane FG S	2,5-3,0 ltr.	30-33	Anvend maks. 2,5 ltr. Ariane FG S i 1. års frømark. Anvendes maks. 1 gang pr. sæson.
Blandet ukrudt inkl. kamille		Mustang Forte	1,0 ltr.	30-33	Vær opmærksom på restriktioner for efterfølgende afgrøder.
Blandet ukrudt inkl. skræpper		Catch + DFF/Sempra	0,6 ltr. + 0,05 ltr.		Off-label. Halm må ikke opfodres.
Storke- og hejrenæb		Zypar + DFF/Sempra	0,75-1,0 ltr. + 0,05 ltr.	23-32	
Vindaks, rævehale, alm. rapgræs og hanespore		Foxtrot + Contact	0,8-1,0 ltr. + 0,4 ltr.		Ingen nattefrost. Dagstemperaturen skal være over 15°C.
Fremmede græsser i rødsvingel og stivbladet svingel		Focus Ultra + Dash	1-1,5 ltr. + 0,5 ltr.		Udsprøjtes, når kvik eller græsukrudt er i god vækst og har min. 3-4 blade. Halm må ikke opfodres.
Vækstregulering		Medax Top + Kvikup	0,4-1,2 ltr. + 0,5 ltr.	31-49	
		Trimaxx + Contact	0,4-0,8 ltr. + 0,15 ltr.	30-49	Kan også udbringes sammen med Catch eller svampemiddel. Obs: Anvend maks. 140 g aktivstof. Halm kan opfodres.
		Sonis/Cuadro	0,4-1,2 ltr.	30-49	Halm må ikke opfodres. Sonis: Anvend maks. 200 g aktivstof. Cuadro: Anvend maks. 300 g aktivstof.
Sygdomme*	Rust	Orius Gold + Comet Pro	0,15 ltr. 0,15 ltr.	31-55	
	Meldug, bladplet og rust 1. behandling	Balaya	0,3-0,75 ltr.	39	+ Vækstregulering
	Bladplet og rust 2. behandling	Entargo + Folicur Xpert EC 240	0,25 ltr. + 0,15 ltr.	59-65	Der er opnået store merudbytter for to svampebehandlinger i frøgræs.

* Vær obs på triazolreglerne. Se mere på side 43

MAJS

Majs uden græsudlæg					
Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Ukrudt før fremspiring	Ærenpris	DFF	50-75 ml		Behandles før fremspiring. Godkendt til mindre anvendelse i majs til foder. Laveste dosis på skarp sandjord.
Løsning 1 1. ukrudtssprøjtning	Bredbladet ukrudt + storkenæb og hejrenæb	Harmony 50 SX + Starship (Callisto) + Contact	5,6 g + 0,5 ltr. + 0,2 ltr.	11-12	
Løsning 1 2. ukrudtssprøjtning	Bredbladet ukrudt + græsser	Starship (Callisto) + MaisTer + MaisOil	0,4-0,5 ltr. + 50-75 g + 0,67-1 ltr.	12-16	
	Ovenstående + snerlepileurt	Starane 333 HL + MaisTer + MaisOil	0,15 ltr. + 50-75 g + 0,67-1 ltr.	12-16	Anvend maks. 0,15 ltr. Starane 333 HL pr. ha.
Løsning 2 1. ukrudtssprøjtning	Bredbladet ukrudt + kvik og kulturgræsser	Starship (Callisto) + MaisTer + MaisOil	0,5 ltr. + 50 g + 0,67 ltr.	11-12	Hvis der er mange storke/hejrenæb, tilsættes 0,4 ltr. Fighter 480. MaisTer anvendes i split-behandling med 10-14 dages mellemrum for effekt på både skærmaks og hanespore. Anvend maks. 150 g MaisTer pr. ha.
Løsning 2 2. ukrudtssprøjtning	Bredbladet ukrudt + kvik og kulturgræsser	Starship (Callisto) + MaisTer + MaisOil + Onyx EC	0,3-0,5 ltr. + 50-100 g + 0,67-1,25 ltr. + 0-6 ltr.	12-16	Ved forekomst af ærenpris bør der sprøjtes tidligt. Ved forekomst af tidsler, gråbynke, spildkartofler og hanespore hæves Starship til 0,75 ltr. i begge sprøjtninger.
Evt. 3. ukrudtssprøjtning	Pileurt, brandbæger, skræppe, kærgaltesand og sort nat-skygge	Starane 333 HL	0,15 ltr.	12-16	Udsprøjtes ved temperatur på min. 12°C inden majsens 6. bladstadie. Anvend maks. 0,15 ltr. pr. ha.
Skadedyr	Fritflue	Lamdex	0,3 kg	10-12	Udsprøjtes på majsens 1½-2 bladstadie. Max. 1 behandling pr. år.
Svampe	Majsøjeplet/ majsbladplet	Propulse	0,6 ltr.	32-69	I stadie 51-65 er hanblomsten synlig.
		Comet Pro	0,7 ltr.	30-65	

Ærter					
Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Basisløsning: Ukrudt før fremspiring	Bredbladet ukrudt	Fenix + Glyphomax 480 HL	0,75-1,5 ltr. + 1,0 ltr.		I blanding med Glyphomax 48 HL før fremspiring kræver det en god timing = umiddelbart før fremspiring.
		Novitron DAM TEC	1-1,5 kg		
		Centium	0,25 ltr.		Behandles senest 2 dage efter såning.
Opfølgende sprøjtning på 2-kimbladet ukrudt.	Blandet ukrudt inkl. korsblomstret og stedmoder	Fighter 480 + Stomp CS	0,5 ltr. + 0,5 ltr.	10-12	Anvendes ved minimum 12°C. Behandles på 4-5 cm høj afgrøde.
Græsukrudt	Kvik, flyvehavre samt andre grove græsser	Focus Ultra + Dash	1,0-3,0 ltr. + 0,5 ltr.	12-39	Det bedste sprøjtetidspunkt er, når græsserne har udviklet 2-3 blade (kvik dog 3-5 blade). Anvend den højeste dosering mod kvik.
	Kvik, flyvehavre samt andre græsser	Agil + Contact	0,5-0,93 ltr. + 0,2 ltr.	31-33	
Sygdomme i ærter	Ærtesyge, ærteskimmel, ærterust og meldug	Mirador 250 SC	0,5 ltr.	51-69	Den bedst effekt opnås ca. 2 uger efter begyndende blomstring.
Skadedyr	Bladrandbiller, ærtevikler, lus og bønnefrøbiller	Lamdex	0,2 kg		Maks. 3 behandlinger pr. sæson.
	Bladlus	Pirimor 500 WG	0,25 kg		Maks. 1 behandling pr. sæson

HESTEBØNNER

Hestebønner					
Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Basisløsning: Ukrudt før fremspiring	Bredbladet ukrudt	Fenix + Glyphomax 480 HL	0,75-1,5 ltr. + 1,0 ltr.		I blanding med Glyphomax 48 HL før fremspiring kræver det en god timing = umiddelbart før fremspiring.
		Novitron DAM TEC	1-1,5 kg		
		Centium/Clomate	0,25 ltr.		Behandles senest 2 dage efter såning.
Nødløsning i 2-kimbladet ukrudt	Blandet ukrudt inkl. korsblomstret og stedmoder	Fighter 480	1,0 ltr.	10-12	Fighter 480 er godkendt til mindre anvendelse i hestebønner. Anvendes ved minimum 12°C. Behandles på 4-5 cm høj afgrøde. Tilsæt evt. Stomp CS.
Græsukrudt	Kvik, flyvehavre samt andre grove græsser	Focus Ultra + Dash	1,0-3,0 ltr. + 0,5 ltr.	12-39	Det bedste sprøjtetidspunkt er, når græsserne har udviklet 2-3 blade (kvik dog 3-5 blade). Anvend den højeste dosering mod kvik.
	Kvik, flyvehavre samt andre græsser	Agil + Contact	0,5-0,93 ltr. + 0,2 ltr.	31-33	
Sygdomme: én behandling	Skimmel, bønnebladplet, chokoladeplet og rust	Pictor Active + Contact	0,75 ltr. + 0,2 ltr.	61-75	Den bedste effekt opnås ca. 2 uger efter begyndende blomstring. Gentag 10-14 dage senere. (Mindre anvendelse).
Sygdomme: 2-delt behandling	Skimmel, bønnebladplet, chokoladeplet og rust	Pictor Active + Contact	2 x 0,4 ltr. + 2 x 0,2 ltr.	61-75	Splittes med 7-15 dages mellemrum.
Skadedyr i ærter og hestebønner	Bladrandbiller, ærtevikler, lus og bønnefrøbiller	Lamdex	0,2 kg		Maks. 3 behandlinger pr. sæson.
	Bedebladlus	Teppeki	0,14 kg	11-71	Maks. 1 behandling pr. sæson
	Ærtebladlus	Pirimor	0,25 kg	30-88	Maks. 1 behandling pr. sæson

Focus® Ultra

Ukrudtsmiddel

Mod spildkorn og grove græsser i blandt andet sukkerroer, vinterraps, kartofler, ærter, hestebønner og DUO-majs



LÆS MERE



BASF
We create chemistry

Produktet skal anvendes på forsvarlig måde.
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet for anvendelse.
Medlem af Dansk Planteværn.

RAPS

Vinterraps, forår					
Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Kamille, burresnerre, valmure og storkenæb		Korvetto	0,65 ltr.	30-50	Knopper må ikke være synlige. Minimum temperatur 8-10°
Kvik og flyvehavre samt andre græsser		Agil 100 EC	0,7 ltr.	30	Alternativt kan der med fordel anvendes splitsprøjtning (2 x ½ dosering).
		Focus Ultra + Dash	1,0-1,5 ltr. + 0,5 ltr.	30	
Vækstregulering		Caryx	0,35-0,7 ltr.	30	Udbringes i strækning ved ca. 20 cm stængel.
	Lys bladplet	Folicur Xpert EC 240	0,4 ltr.	31-69	
Svampe	Knoldbægersvamp og skulpesvamp	Propulse SE 250	0,7 ltr.	65	Udsprøjtes, når 50 % af hovedskuddet er i blomst. Evt. opfølgning med Pictor Active ved meget regn (0,5 ltr. pr. ha.).
		Propulse + Pictor Active	0,35 ltr. + 0,35 ltr.		
		Pictor Active	0,7 ltr.		
Skadedyr	Glimmerbøsser	Mavrik	0,2 ltr.	30-59	
	Skulpesnudebiller og skulpegalmyg	Mavrik	0,2 ltr.	30-71	Behandles maks. 2 gange pr. sæson.
		Lamdex	0,3 ltr.	52-75	Lamdex har Bi-mærke.
Mangelsygdom	Svovlmangel	Pioner S 80	10-15 kg		Udsprøjtes forebyggende, når rapsen er 10-15 cm høj eller ved konstateret mangel.
	Bormangel	Profi Bor 150	1,0-2,5 ltr.		Udsprøjtes forebyggende, når rapsen er 10-15 cm høj eller ved konstateret mangel.
	Magnesiummangel	EPSO Mikrotop	25 kg		
	Manganmangel	Profi ManganNO3 + Contact	1,0-2,0 ltr. + 0,2 ltr.		

RAPS

Vinterraps, efterår					
Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Bredbladet ukrudt		Clomate/Centium 36 CS	0,2-0,25 ltr.		Behandles senest 2-3 dage efter såning. Laveste dosis på let jord.
Bredbladet ukrudt + valmue		Clomate/Centium 36 CS + Stomp CS	0,15 ltr. + 0,44 ltr.		Behandles senest 2-3 dage efter såning.
Valmue, kamille, burrenerre, kornblomst, tvetand og melde		Belkar	0,25-0,5 ltr.		Raps 2-6 blade. Vær opmærksom på dosis i forhold til rapsens udviklingstrin.
Agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, fuglegræs, rajgræs, rapgræs, vindaks og væselhale		Kerb 400 SC			Godkendt i november-december. Minimum vækststadiet 15.
Spildkorn + græsser		Agil 100 EC + Contact	0,4 - 0,7 ltr. + 0,2 ltr.		Spildkorn behandles ved 1-2 blade.
		Focus Ultra + Dash	0,4-0,8 ltr. + 0,5 ltr.		Spildkorn behandles ved 1-2 blade og græsser behandles ved 1,5 blade. Bedst effekt over for rajgræsser.
Skadedyr	Raps jordlopper	Lamdex	0,2 kg	0-5	Maks. 3 behandlinger pr. sæson.
		Kaiso Sorbie	0,1 kg	Oktober	Maks. 3 behandlinger pr. sæson
	Agersnegle	Ferrex	2-5 kg		Behandles snarest efter såning. Gentag efter behov.
Vækstregulering		Caryx	0,4-0,7 ltr.	13-20	Største dosis ved store rapsplanter.

BEDEROER

Bederoer					
Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Før fremspiring	Storkenæb, ærenpris, tvetand, fuglegræs og hyrdetaske	Clomate/Centium 36 CS	0,1-0,2 ltr.		Undgå overlap. Anvend maks. 0,1 ltr. på sandjord. Undgå regn umiddelbart efter sprøjtning.
Ukrudt 1. sprøjtning på kimbladstadiet	Bredbladet ukrudt inkl. enårig rapgræs, kamille og fuglegræs	Betanal + Metafol 700 + Renol Olie	1-2 ltr. + 0,75-1,0 ltr. + 0,5 ltr.	10-12	Anvendes på ukrudtets kimbladstadiet. Ved sen sprøjtning øges dosis ifht. ukrudtets størrelse.
Ukrudt 2. sprøjtning maks. 8 dage efter 1. sprøjtning	Bredbladet ukrudt inkl. burrenerre, sort natskygge, storkenæb, hundepersille, gulurt og fliget brøndsæl	Betanal + Metafol 700 + Nortron SC + Renol Olie	1-2 ltr. + 0,75 ltr. + 0,15-0,23 ltr. + 0,5 ltr.	10-12	Dosering af olie: 0,5 ltr. olie: temperatur under 15°C. 0,2 ltr. olie: temperatur mellem 15-20°C.
Ukrudt 3. sprøjtning 10-14 dage efter 2. sprøjtning på nyfremspiret ukrudt	Bredbladet ukrudt inkl. burrenerre, sort natskygge, storkenæb, hundepersille, gulurt og fliget brøndsæl	Betanal + Metafol 700 + Nortron SC + Safari 50 WG + Renol Olie	1-2 ltr. + 0,75 ltr. + 0,15-0,23 ltr. + 7,5 g + 0,5 ltr.	12-15	En evt. 4. sprøjtning med den resterende mængde Betanal kan være nødvendig 10-14 dage efter 3. sprøjtning (tilse afgrøden). Anvend maks. 3 ltr. Metafol 700 pr. sæson.
Ukrudt Hvis der er brug for en senere opfølgning	Ferskenpileurt, kamille og spildraps	Safari 50 WG + Renol Olie	15 g + 0,5 ltr.		Anvend maks. 15 g Safari pr. sæson.
	Kvik og flyvehavre samt andre græsser	Focus Ultra + Dash	1,5 ltr. + 0,5 ltr.		Anvend den højeste dosering mod kvik - alternativt kan der med fordel anvendes splitsprøjtning (2x½ dosering).
Agil 100 EC		0,75-1,5 ltr.			
Svampe		Amistar Gold	1 ltr.	39-49	Hold øje med nye godkendelser.
		Comet Pro	0,6 ltr.		Anvend evt. splitsprøjtning.
Skadedyr	Trips, jordlopper og bedefluens larve	Lamdex	0,2 kg		Maks. 3 behandlinger pr. sæson. Følg udsendte prognoser/varslinger og tilse afgrøden løbende gennem sæsonen.
	Bladlus	Pirimor 500 WG	0,3 kg		Maks. 1 behandling pr. sæson pr. produkt.
		Tepeki	0,14 kg		Maks. 1 behandling pr. sæson pr. produkt.
Mangelsygdomme	Bormangel	Profi Bor 150	1,5-2,5 ltr.		Udsprøjttes forebyggende eller straks ved konstateret mangel.
	Manganmangel	Profi ManganNO3 + Contact	1,0-2,0 ltr. + 0,2 ltr.		

Foråret starter med Cossack

– Følg **Cossack Vejret** og tilpas dosis efter ukrudtets størrelse



Cossack®



COSSACK®
VEJRET

0,93 l/ha Cossack
Stort græsukrudt



0,7 l/ha Cossack
Mellem græsukrudt



0,5 l/ha Cossack
Småt græsukrudt



Hør mere hos din konsulent eller læs mere på
www.cropscience.bayer.dk



Scan QR-koden for mere information
om Cossack eller gå ind på
www.cropscience.bayer.dk



Christian Søndergaard
Christensen
2894 3024



Jens-Richardt
Thyssen
2810 4611



Klaus
Nielsen
2894 2068

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

KARTOFLER

Kartofler - Bejdsning og ukrudt					
Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Udsædsbårne sygdomme	Rodfiltsvamp	Rizolex 50 FW + RizoPlus	0,75 ltr. + 50 ml	Ved lægning	Udbringes med specialudstyr ved lægning.
		Maxim 100 FS	0,625 ltr.		Anvend 25 ml pr. hkg (250 ml pr. ton). Den angivne dosis er baseret på en udsædsmængde på 2,5 ton pr. ha. Skal sprøjtes på knoldene, se også opblandingsanvisninger. Forspirede læggekartofler kan også bejdses.
		Serenade	5 ltr.		Kan blandes i de to andre løsninger.
1. sprøjtning inden kartoflernes fremspiring	Bredbladet ukrudt inkl. korsblomst, kamille, hanekro, vej- og snerlepileurt	Fenix	1,0-1,5 ltr.	Til 40 dage før høst	Anvend maks. 2,5 ltr. pr. ha pr. sæson. Hvis ukrudtet er blevet for stort, kan der inden behandling tilsættes 1,25 ltr. Glyphomax 48 HL (aldrig i læggekartofler).
	Bredbladet ukrudt inkl. sort natskygge	Novitron DAM TEC	2,4 kg	Før fremspiring	Anvendes, når kartoflerne er færdighyppede, og kammen har sat sig, dog senest 5 dage før fremspiring.
	Bredbladet ukrudt inkl. sort natskygge	Centium 36 CS + Fenix	0,2 ltr. + 2,0 ltr.		Anvendes senest 5 dage før kartoflernes fremspiring.
	Bredbladet ukrudt, enårig rapgræs og fuglegræs	Proman	1-2 ltr.	Før fremspiring	
2. sprøjtning 10-14 dage efter	Overstående samt sort natskygge	Boxer	2 ltr.	Til 42 dage før høst	Udbringes i 2. sprøjtning.
Alternativ plan 1 uge før fremspiring (fabrikkartofler)	Snerlepileurt, burresnerre, enårig rapgræs og vejpileurt	Novitron DAM TEC	1,0-1,2 kg	Før fremspiring	
Ukrudt	Kvik og flyvehavre samt andre græsser	Focus Ultra + Dash	1,5-2 ltr. + 0,5 ltr.	Til 56 dage før høst	Anvend den højeste dosering mod kvik - alternativt kan der med fordel anvendes splitsprøjtning (2x½ dosering).
		Agil 100 EC	0,75-1,25 ltr.	Til 2 mdr. før høst	

KARTOFLER

Kartofler - Skadedyr og sygdomme					
Problem		Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Skadedyr	Tæge, coloradobille, cikade og bladlus	Lamdex	0,3 kg	Til 14 dage før høst	Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Oftest randbehandling.
	Coloradobille, cikade og bladlus	Mospilan SG	150-250 g	Til 3 dage før høst	Følg udsendte prognoser/varslinger og tilse afgrøden løbende gennem sæsonen. Systematisk virkning med langtidseffekt. Anvend den højeste dosering ved cikader. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
	Bladlus virusforbyggende	Teppeki	160 g	Til 14 dage før høst	Kan anvendes i læggekartofler.
Sygdomme	Kartoffelbladplet	Amistar/Mirador 250 SC	0,3-0,5 ltr.	Til 7 dage før høst	Forebyggende behandling. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
		Propulse	0,45 ltr.		Forebyggende behandling. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
		Signum + Revus	0,25 kg + 0,6 ltr.		Forebyggende behandling. Maks. 4 behandlinger pr. sæson.
		Narita	0,4 ltr.		Forebyggende behandling. Maks. 3 behandlinger pr. sæson.
	Ved overskredet sprøjteinterval og højrisiko	Option 60	0,20 kg	15-93	Forebyggende behandling. Maks. 8 behandlinger pr. sæson.
Sygdomme	Kartoffelskimmel	Shirlan Ultra	0,4 ltr.	32-91	Forebyggende behandling. Maks. 10 behandlinger pr. sæson.
		Sporax	1,4 ltr.	10-97	Forebyggende behandling. Maks. 6 behandlinger pr. sæson
		Revus + Contact	0,2 ltr. + 0,25 ltr.	Til 7 dage før høst	
		Proxanil	2-2,5 ltr.	Til 14 dage før høst	Forebyggende behandling forud for højrisikoperiode.
		Zorvec Enicade	0,15 ltr.		Maks. 2 behandlinger pr. sæson med 7-10 dages interval. Blandes med Shirland Ultra.
	Ved overskredet sprøjteinterval og højrisiko	Option WG	0,20 kg	15-93	Forebyggende behandling. Maks. 8 behandlinger pr. sæson.
	Knoldskimmel	Contact	0,5 ltr. + 0,2 ltr.	Til 7 dage før høst	Forebyggende sprøjtning ved risiko for knoldskimmel sidst på sæson.

SKOVBRUG M.M.

Skovbrug - juletræer				
Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Bredbladet ukrudt og græs	Glyphomax 480 HL	2,0-2,5 ltr.	Efterår	Behandles, når strækingsvæksten er afsluttet, forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannet.
	Glypper Go	2,0 ltr.	Forår	Godkendt med off-label. Det er vigtigt, at sprøjtning udføres inden der er tegn på knopbrydning.
Bredbladet ukrudt	Accurate Max 250 WG	20 g	Forår	Godkendt til mindre anvendelse og kun i foråret. Må ikke anvendes senere end 10. juni.
Bredbladet ukrudt og græs, inkl. kamille, brandbæger og bakkestjerne	Quartz + Logo + Olie	0,25 ltr. + 150 g + 2,0 ltr.		Quartz udsprøjtes i det tidlige forår. Logo udsprøjtes omkring maj, dog senest 10 dage før knopbrydning.
Bjørneklo og rød hestehov	Glyphomax 480 HL			Anvend 0,15 ltr. Glyphomax pr. 8 ltr. vand. Skal pensles på. Påstryk kun de planter, der ønskes bekæmpet.
Vækstregulering	Proxy	0,4 ltr.	Maj-juni	Påføres med rulle i 0,5-0,75 % opløsning. Kun godkendt i Nordmannsgran til juletræer.

Beplantning og planteskolekultur				
Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Ukrudt	Græsser	Kerb 400 SC	0,75-1 ltr.	November-December Jordtemperatur under 7°C.
Skadedyr	Bladlus, ædelgranlus, bladbiller, vikler- og målerlarver og barkbiller	Axiendo 2,5 WG	0,3-0,4 kg	Ved begyndende angreb Der sprøjtes ved konstaterede angreb. 6-800 liter vand. Maks 2 behandlinger pr. sæson.
	Nåletræsnudebiller	Axiendo 2,5 WG	2,0-8,0%	Behandles ved konstateret angreb efter varsling. Off-label godkendelse.
	Alm. ædelgranlus, grøn ædelgranlus, brune ædelgranlus, sitkalus og bøgebladlus	Mospilan SG	0,25 kg	Lune perioder marts-maj Maks. 2 behandlinger pr. sæson.

SKOVBRUG M.M.

Udyrkede arealer				
Problem	Løsning	Dosis/ha	Anbefalet stadie	Bemærkning
Græsukrudt og tokimbladet ukrudt	Glyphomax 480 HL	3,0-4,5 ltr.	Ukrudt i god vækst	Må sprøjtes på udyrkede arealer, som ikke er befæstede eller stærkt permeable. Hvis det er i rygsprøjte, skal der bruges mellem 30-45 ml i 10 liter vand, som rækker til 100 m ² .
	Katoun Gold	22,5 ltr.	Ukrudt under 10 cm højt og i god vækst	Må bruges på befæstede og stærkt permeable arealer. Behandles 4 gange med minimum 2 ugers interval.
	TopGun Finalsan Koncentrat	166 ltr.	Ukrudt ca. 5-10 cm	Må bruges maks. 8 gange pr. år. Hurtigst synlig effekt opnås ved temperaturer over 10°C. 1,6 ltr. blandet i 8,4 ltr. vand rækker til 100 m ² .

BESTILLINGSLISTE PLANTEVÆRN 2024

Varenr.	Ukrudsmidler korn/frøgræs	Stk.
550471	Accurate Max 75WG 250 gr. (Ally)	
550481	Adimax 20 L	
550692	Ariane FG S 5 L	
551511	Atlantis OD 5 L	
554443	Boxer 20 L	
554401	Broadway 1 kg	
555451	Catch 5 L	
555707	Cossack OD 5 L	
556881	DFF 1 L (Semptra)	
558681	Express Gold 33 SX 100 gr.	
560341	Hussar Plus OD 1 L	
563101	Mateno Duo 5 L	
563171	Mustang Forte 5 L	
564101	Nuance Max 75 WG 100 gr. (Express)	
564311	Othello OD 5 L	
565631	Pixxaro EC 5 L	
563501	Rexade 0,5 kg	
567301	Saracen M 0,5 L (Primus)	
567321	Serrate 1 kg	
567895	Starane 333 HL 3 L	
567892	Starane XL 15 L	
567951	Stomp CS 10 L	
569361	Topik EC 5 L	
562282	U46 M 10 L (MCPA)	
569881	Zypar 5 L	
Varenr.	Ukrudsmidler Raps	Stk.
550564	Agil 5 L	
554021	Beklar 3 L	
555521	Clomate 3 L	
559051	Focus Ultra 5 L (Husk Dash)	
561060	Kerb 400 SC 5 L	
561081	Korvetto 3 L	
Varenr.	Ukrudsmidler Majs	Stk.
558701	Evolya 1kg (Tocalis)	
551872	Fighter 480 5 L	
560202	Harmony 50SX 100 gr.	
562323	MaisTer 750 g +olie 10 L	
564221	Onyx EC 5 L	
567895	Starane 333 HL 3 L	
567901	Starship 5 L (Callisto)	
Varenr.	Svampemidler Majs/Roer	Stk.
550010	Amistar Gold 10 L	
563893	Propulse SE 250 5 L	

Varenr.	Ukrudsmidler Kartoffler	Stk.
553991	Belounkha 10 L	
553111	Centium 36 CS 5 L	
558841	Fenix 5 L	
563881	Novitron DAM TEC 12 kg	
562541	Mizuki 10 L	
565501	Proman SC 10 L	
Varenr.	Ukrudsmidler Roer	Stk.
553981	Betanal 10 L	
553111	Centium 36 CS 5 L	
555521	Clomate 3 L (Command CS/Centium)	
559051	Focus Ultra 5 L (Husk Dash)	
562221	Metafol SC700 10 L (Goltix)	
562230	Nortron SC 5 L	
567231	Safari 120 gr. (Salgsforbud 20.04.2024)	
Varenr.	Svampemidler Korn	Stk.
557774	Balaya 5 L	
555611	Comet Pro 5 L	
558231	Entargo 5 L	
559065	Folicur Xpert EC 240 5 L	
550008	Mirador 5 L (Amistar)	
559059	Orius Gold 5 L	
564361	Pictor Active 5 L	
565616	Proline Xpert EC 240 5 L	
563893	Propulse SE 250 5 L	
568601	Talius EC 1 L	
Varenr.	Svampemidler Raps	Stk.
551701	Aventrol 10 L (Skulpesikring)	
559065	Folicur Xpert EC 240 5 L	
550008	Mirador 5 L (Amistar)	
564361	Pictor Active 5 L	
564441	Pod-Stik 5 L (Aventrol)	
563893	Propulse SE 250 5 L	
Varenr.	Svampemidler Kartoffler	Stk.
562530	Narita 5 L	
564251	Option WG 1,5 kg	
563893	Propulse SE 250 5 L	
565611	Proxanil 10 L	
566011	Revus 5 L	
566021	Revus Top SC 5 L	
567411	Shirla Ultra 5 L	
567501	Signum WG 2,5 kg	
567651	Sporax 10 L	
569851	Zorvec Enicade 2,5 L	

BESTILLINGSLISTE PLANTEVÆRN 2024

Varenr.	Skadedyrsmidler	Stk.
551721	Axiendo 2,5 WG 5 kg (Lamdex)	
561101	Lamdex 1 kg	
563163	Mavrik 5 L	
562213	Mospilan SG 3 kg.	
560772	Pirimor 500 WG 1 kg	
556793	Teppeki 2 kg.	
Varenr.	Vækstregulering Korn/Frøgræs	Stk.
555421	Caryx 5 L	
555512	Cerone 5 L	
555534	Cuadro 5 L (kun til frøgræs)	
562525	Medax Max 6 Kg	
562522	Medax Top 5 L	
562261	Moddevo 5 L (Moddus Start)	
567931	Sonis 5 L (Moddus M/Cuadro)	
568631	Terpal 5 L	
556071	Trece 750 10 L (CCC)	
562471	Trimaxx M 5 L	
Varenr.	Tilsætningsstoffer	Stk.
567935	Contact 5 L (Spredde-/klæb)	
556701	Dash 5 L	
568411	Kvikup 10 L (Ammoniumsulfat)	
562441	Renol 5 L (Vegetabilsk)	
564201	Nova Balance 5 L	
564421	Penol 33E 5 L (Mineralsk)	
564351	PG 26N 5 L	
Varenr.	Biosimulanter	Stk.
562241	Megafol 10 L (reducerer skader/stress)	
563931	Nutribio N 250 g (kvælstoffikserende)	
565701	Quantis 10 L (plantestimulerende)	
567371	Serenade ASO 10 L (kartoffelbejdse)	
568591	Talisman 5 L (tørke/stress)	

Varenr.	Micronæringsstoffer	Stk.
400320	Epso Combitop 25 kg	
400310	Epso Micro Top 25 kg	
518060	Epso Top/Bittersalt 25 kg	
560961	Kobberoxyylchlorid 25 kg	
561071	Kumulus S 25 kg	
561062	Lebosol Kobber 350 5 L	
564401	Pioner Svovl 80% 25 kg	
554425	Profi Bor 150 10 L	
564001	Profi ManganNO3 10 L	
564011	Profi ManganNO3 640 L	
554435	Profi MnS 166 10 ltr.	
554411	Profi Universal 10 L	
Varenr.	Bejdsemidler kartofler	Stk.
562251	Maxim 100 FS 5 L	
566311	Rizolex 50 FW 1 L	
566051	RizoPlus 1 L	
567371	Serenade ASO SC 10 L	
Varenr.	Specialprodukter	Stk.
550003	All Clear Extra 5 L (Til rens af sprøjte)	
550021	Aminosol 10 L (øko additiv)	
563401	Ferrex 20 kg (Sneglegift)	
560811	K-Obiol EC 25 1 L (Til kornlagre)	
561371	Logo 375 gr. + Olie 5 L	
563871	Nofoam Ultra 200 ml	
565641	Proxy 5 L	
561401	Quartz 1 L	
567601	Sluxx HP 20 kg (Sneglegift)	
569501	Vizura 10 L	
569503	Vizura 50 L	
569511	Vizura 1000 L (Palletank)	
Varenr.	Kvikbehandling	Stk.
560103	Glyphomax 480 HL 20 L	
560111	Glyphomax 480 HL 640 L	
560131	Glypper Go 20 L	
560831	Katoun Gold 5 L	
569351	TopGun 20 L	

Kundenr./telefonnr.:

Navn:

Leveringsadresse:

BESTILLINGEN SENDES TIL:

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
 post@hk-hornslyld.dk
 Tlf. +45 7568 7300

EFFEKTABEL - UKRUDT	VINTERSÆD												DFF for fremspiring	Accurate Max WG + Pixxaro	Nuance Max WG + Pixxaro	Nuance WG + Starane XL
	Cossack OD	Cossack OD + DFF/Sempra	Cossack OD + Zypar	Hussar Plus OD	Atlantis OD	Broadway + PG 26N	Accurate Max WG + Zypar	Starane XL + Express Gold	Mustang Forte	Starane 333 HL	Foxtrot	U46 M-MCPA				
Agerrævehale	XXX	XXX	XXX	X	XXX	XXX	-	-	-	-	XXX	-	-	-	-	-
Alm. rapgræs	XXX	XXX	XXX	X	XXX	XXX	-	-	-	-	XXX	-	-	-	-	-
Blød Hejre	XXX	XXX	XXX	X	XX	XXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enårig rapgræs	XXX	XXX	XXX	XX	XXX	XX	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-
Flyvehavre	XXX	XXX	XXX	XX	XX	XX	-	-	-	-	XXX	-	-	-	-	-
Gold hejre	XX	XXX	XXX	X	XX	XXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvik	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rajgræs	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vindaks	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	-	-	-	-	XXX	-	-	-	-	-
Væselhale	XX	XX	XX	X	XX	XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agerkål/-sennep/kiddike	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	-	XXX	X	XXX	XXX	XXX
Agerstedmoder	XX	XXX	XXX	XX	X	XX	XX	X	X	X	-	X	XXX	XX	XX	XX
Agertidse	X	XXX	XX	X	X	X	X	X	XXX	X	-	XXX	-	-	-	X
Bleg/fersken pileurt	XXX	XXX	XXX	XXX	X	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	-	X	-	XXX	XXX	XXX
Burresnerre	XXX	XXX	XXX	XXX	X	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	-	X	-	XXX	XXX	XXX
Forglemmigej	XX	XXX	XXX	XX	X	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	-	X	-	XXX	XXX	XXX
Fuglegræs	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	-	X	XX	XXX	XXX	XXX
Gul okseøje	XX	XXX	XXX	X	X	XXX	XXX	XX	XX	X	-	X	-	XX	X	X
Grøn skærmaks	-	XXX	XXX	XXX	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
Hanekro	XXX	XXX	XXX	XXX	X	XXX	XXX	XXX	X	XXX	-	X	-	XXX	XXX	XXX
Hyrdetaske	XXX	XXX	XXX	XXX	X	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	-	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
Kamille	XXX	XXX	XXX	XXX	X	XXX	XXX	XXX	XXX	X	-	X	-	XXX	XXX	XXX
Kornblomst	XX	XXX	XXX	XX	X	XXX	XXX	XXX	XXX	X	-	X	-	XXX	XXX	XXX
Kornvalmue	XXX	XXX	XXX	XXX	X	XXX	XXX	XXX	XXX	X	-	XXX	-	XXX	XXX	XXX
Læge jordrøg	XX	XXX	XXX	XX	X	X	XXX	X	XX	X	-	X	-	XXX	XXX	X
Melder	XXX	XXX	XXX	XXX	X	X	XXX	XXX	XXX	X	-	XXX	-	XXX	XXX	XXX
Rød tvetand	XXX	XXX	XXX	XXX	X	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	-	X	XXX	XXX	XXX	XXX
Snerle pileurt	XX	XXX	XXX	XX	X	X	XXX	XXX	XXX	XXX	-	X	-	XXX	XXX	XXX
Sort natskygge	XXX	XXX	XXX	XX	X	XXX	XX	XX	XX	X	-	X	-	X	XX	XX
Spildraps	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	-	XXX	-	XXX	XXX	XXX
Storkenæb/hejrenæb	XX	XXX	XXX	XX	X	XX	XXX	XXX	XX	XX	-	X	-	XXX	XXX	XX
Vejpileurt	XX	XXX	XXX	XX	X	XX	XX	XX	XX	XX	-	X	-	XXX	XXX	XX
Ærenpris	X	XXX	XXX	X	X	XXX	X	X	X	X	-	X	XXX	X	XXX	X

VÅRSÆD							VINTERRAPS						MAJS			KARTOFLER					
Hussar Plus OD, vinterraps, majs, kartofler	Mustang Forte + DFF	Stomp CS	Fighter 480	Foxtrot	U46 M-MCPA	Agil 100 EC	Focus Ultra + DASH	Kerb 400 SC	Galera + PG 26N	Matrigrøn 72SG	Reactor SC/ Command	DFF før fremspring	Harmony 50 SX + Starship	Starship + Maister	Starane 333 HL	Fenix + Titus WSB	Novitron DAM TEC	Boxer	Focus Ultra + DASH	Agil 100 EC	
-	-	-	-	XXX	-	XXX	XXX	XXX	-	-	-	-	-	XXX	-	X	X	X	XXX	XXX	
XX	-	-	-	XXX	-	XXX	XXX	XXX	-	-	-	-	-	XXX	-	X	X	X	XXX	XXX	
X	-	-	-	X	-	XX	X	XXX	-	-	-	-	-	XXX	-	X	X	X	X	XX	
XX	-	-	-	X	-	X	XX	XXX	-	-	-	-	-	XXX	-	XXX	XX	X	XX	X	
XX	-	-	-	XXX	-	XXX	XXX	XXX	-	-	-	-	-	XXX	-	XXX	X	X	XXX	XXX	
-	-	-	-	X	-	XX	X	XXX	-	-	-	-	-	XXX	-	X	X	X	X	XX	
-	-	-	-	X	-	XXX	XX	X	-	-	-	-	-	XXX	-	XX	X	X	XX	XXX	
XXX	-	-	-	X	-	XX	XXX	XXX	-	-	-	-	-	XXX	-	XXX	X	X	XXX	XX	
XXX	-	-	-	X	-	XXX	XX	XXX	-	-	-	-	-	XXX	-	X	X	X	XX	XXX	
-	-	-	-	-	-	-	-	XX	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	
XXX	XXX	-	XXX		XXX	-	-	-	X	X	X	X	XXX	XXX	X	XXX	XXX	X	-	-	
XX	XXX	-	X	X	X	-	-	-	X	X	X	XXX	XXX	XXX	X	X	X	X	-	-	
-	XX	-	X		XXX	-	-	-	XX	XXX	X	-	X	XX	XX	XX	XX	X	-	-	
XXX	XXX	-	XXX		X	-	-	-	X	X	XX	X	XXX	XXX	XX	XXX	XXX	X	-	-	
XXX	XXX	-	XX	X	X	-	-	-	XX	X	XX	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	-	-	
XXX	XXX	-	X	X	X	-	-	-	X	X	XX	X	XXX	XXX	X	XXX	XXX	XXX	-	-	
XXX	XXX	-	XXX	X	X	-	-	XXX	X	X	XXX	XX	XXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX	-	-	
XX	XX	-	XXX	X	XXX	-	-	-	X	XXX	X	X	X	XX	XX	XXX	X	X	-	-	
X	-	-	X		X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	
XXX	XXX	-	X	X	X	-	-	-	X	X	XX	X	XXX	XXX	X	XXX	XX	X	-	-	
XXX	XXX	-	X	X	XXX	-	-	-	X	X	XXX	X	XXX	XXX	X	XXX	XXX	XX	-	-	
XXX	XXX	-	XXX	X	X	-	-	-	XXX	XXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX	XX	X	-	-	
X	XXX	-	XXX	X	X	-	-	-	XXX	XXX	X	X	-	XX	X	XXX	X	X	-	-	
XXX	XXX	-	XX	X	XXX	-	-	-	X	X	X	X	X	XXX	X	XXX	XXX	X	-	-	
X	XX	-	X	X	X	-	-	-	X	XXX	X	X	XX	XXX	X	X	XX	X	-	-	
XXX	XXX	-	XXX	X	XXX	-	-	-	XXX	X	X	X	XXX	XXX	X	XXX	XXX	X	-	-	
XXX	XXX	-	X	X	X	-	-	-	X	X	XX	XXX	XXX	XXX	X	XXX	XX	XX	-	-	
XXX	XXX	-	XXX	X	X	-	-	-	XX	X	X	X	XXX	XXX	XXX	XX	XX	X	-	-	
XXX	XX	-	XXX	X	X	-	-	-	X	XX	X	X	XXX	XXX	X	XX	XXX	X	-	-	
XXX	XXX	-	XX	X	XXX	-	-	-	X	X	X	X	XXX	XXX	X	XXX	XXX	X	-	-	
XX	XXX	-	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	XX	X	XX	XX	X	-	-	
XX	XX	-	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	XXX	XXX	X	XX	XX	X	-	-	
XX	XX	-	X	X	X	-	-	-	X	X	XX	XXX	XX	XXX	X	XX	XX	XX	-	-	

Vurderet effekt: XXX = 85-100 % effekt XX = 60-85 % effekt X = Under 60 % effekt/begrænset effekt - = Ikke relevant eller ingen oplysninger

EFFEKTABEL - SVAMPE I KORN

SYGDOMME	RELATIV VIRKNING AF GODKENDETE SVAMPEMIDLER I KORN					
	Amistar Gold/ Greteg Star	Amistar/ Mirador	Balaya	Comet Pro	Entargo	Folicur Xpert EC 240
	(Azoxystrobin + difenoconazol)	(azoxystrobin)	(Revysol + pyraclostrobin)	(pyraclostrobin)	(Boscalid)	(tebuconazol + prothioconazol)
Knækkefodsyge	-	-	*	-	**	*
Hvedemeldug	*(*) 1)	* 1)	***	* 1)	-	***(*)
Bygmeldug	-	* 1)	***	** 1)	-	***(*)
Gulrust	***	***	****	***(*)	*	****
Brunrust	***	***(*)	****(*)	****	*	****
Bygrust	-	****(*)	****(*)	****(*)	*	****(*)
Septoria	**(*)	* 1)	****(*)	* 1)	**	**(*)
Hvedebladplet	* 1)	* 1)	**	* 1)	-	**
Skoldplet	**	**(*)	***(*)	***(*)	*	***
Bygbladplet	-	**(*) 2)	***(*)	****	**	**(*)
Ramularia	-	-	***(*)	-	**	*
Aksfusarium	-	-	*	-	-	**(*)
Normaldosering, liter/kg pr. ha	1,0	1,0	1,5	1,25	0,7	0,5 3)
Pris pr. normaldosering inkl. afgift, ekskl. moms	305	235	699	413	310	138

- = ikke aktuel, ikke godkendt eller ingen data
- * = svag effekt (under 40 %)
- ** = nogen effekt (40-50 %)
- *** = middel til god effekt (51-70 %)
- **** = meget god effekt (71-90 %)
- ***** = specialmiddel (91-100 %)
- (*) = en halv stjerne

Juventus 90	Mirador Forte	Orius Gold	Proline	Proline Xpert EC 240	Propulse	Prosaro	Talius EC
(metconazol)	(tebuconazol + azoxystrobin)	(tebuconazol)	(prothioconazol)	(tebuconazol + prothioconazol)	(prothioconazol/ fluopyram)	(tebuconazol + prothioconazol)	(proquinazid)
-	-	-	**	**	*(*)	*(*)	-
**	**(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	****(*)
***	***	****	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	****(*)
(*)	*(*)	****(*)	***	***(*)	***	****	-
(*)	***(*)	*(*)	***	***(*)	***	****	-
****	*****	*****	***(*)	****	***(*)	****(*)	-
(*)	**	**(*)	**(*)	**(*)	*(*)	**(*)	*
*	* 1)	*	***(*)	***(*)	***(*)	***	-
***	**(*)	**	****	****	****(*)	***	-
(*)	** 2)	**(*)	*	***	****(*)	**(*)	-
-	-	-	**	*	***	*	-
**	*	**	**(*)	**(*)	**(*)	**(*)	-
1,0	1,5	1,25	0,8	0,75 3)	1,0	1,0	0,25
282	345	215	352	281	360	320	174


1) På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt ramularia meget begrænset

2) Mod bygbladplet kan også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador/Mirador forte


3) Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.

UDVIKLINGSSTADIER

HVEDE




BYG



RUG




HAVRE




UDVIKLINGSSTADIER


RAPS




MAJS



KARTOFLER



ÆRTER



SPRØJTETEKNIK

Afgøde ltr./ha	Vand	Forslag til dysetype ISO nr.
KORN, RAPS OG HESTEBØNNER		
Ukrudt med bladmidler	120-170	025/030 lavdrift/refleks dyse. Hvis der anvendes kompakt luftinjektion, hæves vandmængden
Ukrudt med jordmidler herunder prosulfocarb	200-250	025/030 kompakt injektion med 75-90 % afdriftsreduktion
Vækstregulering og tidlig svampebekæmpelse	150	025/030 lavdrift/refleks dyse eller 025/030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
Svampe i korn	150-250 *	025/030 lavdrift/refleks dyse eller 025/030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
Svampe i raps	200	025/030 lavdrift/refleks dyse eller 025/030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
Rodukrudt	200	025/030 lavdrift/refleks dyse eller 025/030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
Glyphosat	120-150	025/030 lavdrift/refleks dyse eller 025/030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
MAJS OG GRÆS		
Ukrudt i majs	120-150	030 lavdrift/refleks dyse eller 030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
Svampe i majs	200-250	030 lavdrift/refleks dyse eller 030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
Rodukrudt i græs	200	030 lavdrift/refleks dyse eller 030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
ROER OG SPINAT		
Ukrudt	140-170	025 lavdrift/refleks dyse eller 025 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
Svampe	150-200	025 lavdrift/refleks dyse eller 025 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
KARTOFLER		
Ukrudt	120-150	025 lavdrift/refleks dyse eller 025 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
Kartoffelskimmel	150-200	030 lavdrift/refleks dyse eller 030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
Nedvisning med Reglone	mindst 200	030 lavdrift/refleks dyse eller 030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
FRØGRÆS		
Ukrudt	150-170	025/030 lavdrift/refleks dyse eller 025/030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion
Svampe	150-200	025/030 lavdrift/refleks dyse eller 025/030 kompakt luftinjektion med 90 % afdriftsreduktion

* Laveste mængde ved meget dug på bladene

TRIAZOLREGLER

Da der er fundet 1,2,4-triazol i grundvandet, er der fastsat nye triazolregler for tre triazolere, som alle kan nedbrydes til 1,2,4-triazol. Nye triazolregler erstatter derfor de hidtidige triazolregler.

I tabellerne nedenfor ses, hvordan de forskellige produkter påvirker triazolregnskabet i forskellige vækststadier i forhold til totalmængden af triazolere, som man må køre ud i vækstsæsonen. Heraf fremgår det, at brug af triazolholdige produkter i de tidlige vækststadier tæller meget hårdt.

Vintersæd (hvede, byg, rug): Påvirkning af 1,2,4-triazol ved anvendelse i vintersæd (IKKE bejdset med Tebu/Difeno)				
Produkt	Stadie 30-32	Stadie 33-37	Stadie 38-40	Stadie 38-69
0,3 l/ha Orius Gold	89,6 %	45,1 %		
0,3 l/ha Folicur Xpert EC 240	71,6 %	36,1 %		
0,3 l/ha Prosaro EC 250	56,0 %	28,2 %		
0,25 l/ha Proline Xpert EC 240	29,9 %	15,5 %		
0,75 l/ha Balaya			50,0 %	
0,25 l/ha Orius Gold				20,0 %
0,2 l/ha Folicur Xpert EC 240				12,8 %
0,25 l/ha Prosaro EC 250				12,5 %
0,25 l/ha Proline Xpert EC 240				8,0 %

Vårsæd (byg, hvede): Påvirkning af 1,2,4-triazol ved anvendelse i vårsæd (bejdset med Tebu/Difeno)					
Produkt	Stadie 30-32	Stadie 33-37	Stadie 33-48	Stadie 38-69	Stadie 49-69
0,3 l/ha Orius Gold	112,1 %		70,6 %		46,9 %
0,3 l/ha Folicur Xpert EC 240	89,7 %		56,5 %		37,5 %
0,3 l/ha Prosaro EC 250	70,1 %		44,1 %		29,3 %
0,25 l/ha Proline Xpert EC 240	37,4 %		23,5 %		15,6 %
0,75 l/ha Balaya		50,0 %		33,3 %	

**Vi tilbyder plantebeskyttelse
til konkurrencedygtige priser**

- ring til os på tlf. 75 68 73 00

**EN TROVÆRDIG
SAMARBEJDS-
PARTNER TIL DET
MODERNE DANSKE
LANDBRUG**



Der tages forbehold for trykfejl.

Hornsyld Købmandsgaard A/S · Nørregade 28 · 8783 Hornsyld
Tlf. +45 7568 7300 · post@hk-hornsyld.dk · www.hk-hornsyld.dk

HK Mølvang
Mølvangvej 92
7300 Jelling

HK Ejstrupholm
Nørholmvej 15
7361 Ejstrupholm

HK Baastrup
Baastrupvej 26
8722 Hedensted

HK Gødstrup
Vildbjergvej 55
7400 Herning

HK Aller
Aller Møllevej 17
6070 Christiansfeld

Overgaard Gods
Overgårdsvej 28,
8970 Havndal

Førslev Gods
Førslevvej 54
4250 Fuglebjerg