

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd 2024

En effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret giver et højere udbytte og mindsker risikoen for resistent ukrudt. Der er vil være en lang periode. Da der bliver etableret Vintersæd fra før 7. sep. og frem. Derfor er der brug for forskellige strategier. Både for at maksimere effekten, men også fordi risikoen for fordampning af Boxer(prosulfocarb) skal minimeres.

Hvede og triticale:

Standardløsning ved lavt til moderat ukrudtstryk	
Alm. ukrudtsbestand: st. 10-11 (kørespor netop synlige)	1,0 l Boxer 800 EC + 0,1 l DFF
Alm ukrudtsbestand + storkenæb, valmuer, raps, fuglegræs: st. 10-11 (kørespor netop synlige)	0,75 l Boxer 800 EC + 0,35 l Mateno Duo
Dagtemperaturen skal under 15 grader for, at der må køres Boxer(prosulfocarb) Er det ikke tilfældet må løsningen deles	
2-delt strategi ved tidlig såning og for høj temperatur til Boxer (prosulfocarb)	
St. 0-11	0,15 l DFF eller 0,35 l Mateno Duo
Opfølgning ca. 14 dage senere	1,0 l Boxer 800 EC

Målrættede indsatser mod græsukrudt:

I den foregående vækstsæson har det været synligt i mange marker, at der er behov for en mere effektiv indsats mod græsukrudt i efteråret. Så en målrættet indsats er nødvendig specielt overfor rajgræsser, rævehale og væselhale. Sprøjtetidspunktet er ekstremt vigtigt for en høj effekt af Boxer og Mateno Duo på græsukrudt. Det optimale er at sprøjte, når man lige præcist kan ane køresporene – så er græsukrudtet netop klart til at spire igennem og mest følsomt for jordmidlerne. På dette tidspunkt har jorden også "sat sig", og filmen af jordmiddel bliver mere dækkende.

Rajgræs og agerrævehale	
Rajgræs og rævehale St. 09-11	1,5 l Boxer 800 EC + 0,1 l DFF
Opfølgning	0,2 l Topik + 0,5 l olie på græs med max. 2 blade
2-delt strategi ved tidlig såning og for høj temperatur til Boxer (prosulfocarb)	
St. 0-11	0,5 l Mateno Duo
Opfølgning ca. 14 dage senere	1,5 l Boxer 800 EC + 0,2 l Topik
Væselhale	
Væselhale St. 09-11	0,7 l Mateno Duo + 1,5 l Boxer 800 EC
Opfølgning	0,75 l Atlantis ultimo oktober efter behov
2-delt strategi ved tidlig såning og for høj temperatur til Boxer (prosulfocarb)	
St. 0-11	0,7 l Mateno Duo
Midt i oktober	1,0 l Boxer 800 EC + 0,75 l Atlantis

Rug og vinterbyg:

Standardløsning ved lavt til moderat ukrudtstryk	
Alm. ukrudtsbestand: st. 10-11 (kørespor netop synlige)	1,0 Boxer 800 EC + 0,05 DFF
Stor ukrudtsbestand St. 11 – kørespor skal være synlige Opfølges 10-14 dage senere med	0,35 Mateno Duo* 1 Boxer 800 EC*
Vinterbyg med meget græsukrudt St. 09-11	2,5 Boxer 800 EC + 0,05 DFF

* **Mateno Duo og Boxer må ikke Blandes i Rug og vinterbyg**

Skadedyr:

Tidlig såning kan give angreb af bladlus, som kan overføre havrerødsot til vintersæden. Risikoen er størst ved lunt vejr

Pas også på snegle. Fremmes af fugtige forhold, og der ses ofte angreb efter gode forfrugter (raps, frøgræs m.fl.) Vær især opmærksom i kanter og knoldede områder af markerne.

Skadedyr i vintersæd	
Agersnegle	3-4 kg/ha Ferrex 4-5 kg/ha SluXX HP
Bladlus	0,15 kg/ha Lamdex 0,075 kg/ha Kaiso Sorbie