

## Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd 2020

En effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret giver et højere udbytte og mindsker risikoen for resistent ukrudt.

Der er udsigt til en lang såperiode i 2020 og derfor brug for forskellige strategier. Både for at maksimere effekten, men også fordi risikoen for fordampning af Boxer(prosulfocarb) skal minimeres.

### Hvede og triticale:

Standardløsning ved lavt til moderat ukrudtstryk	
Alm. ukrudtsbestand: st. 10-11 (kørespor netop synlige)	1,0   Boxer + 0,1   DFF
Alm ukrudtsbestand + storkenæb, valmuer,raps, fuglegræs: st. 10-11 (kørespor netop synlige)	0,75   Boxer + 0,35   Mateno Duo
Dagtemperaturen skal under 15 grader for, at der må køres Boxer(prosulfocarb) Er det ikke tilfældet må løsningen deles	
2-delt strategi ved tidlig såning og for høj temperatur til Boxer (prosulfocarb)	
St. 0-11	0,15   DFF eller 0,35   Mateno Duo
Opfølgning ca. 14 dage senere	1,0   Boxer

### Målrettede indsatser mod græsukrudt:

Efter den milde vinter var det i 2020 synligt i mange marker, at der er behov for en mere effektiv indsats mod græsukrudt i efteråret. Milde vintre og/eller tidlig såning giver gode betingelser for græsukrudt, så en målrettet indsats er nødvendig specielt overfor rajgræsser, rævehale og væselhale. Sprøjtetidspunktet er ekstremt vigtigt for en høj effekt af Boxer og Mateno Duo på græsukrudt. Det optimale er at sprøjte, når man lige præcist kan ane køresporene – så er græsukrudtet netop klart til at spire igennem og mest følsomt for jordmidlerne. På dette tidspunkt har jorden også "sat sig", og filmen af jordmiddel bliver mere dækkende.

Rajgræs og agerrævehale	
Rajgræs og rævehale St. 09-11	1,5   Boxer + 0,1   DFF
Opfølgning	0,2   Topik + 0,5   olie på græs med max. 2 blade
2-delt strategi ved tidlig såning og for høj temperatur til Boxer (prosulfocarb)	
St. 0-11	0,5   Mateno Duo
Opfølgning ca. 14 dage senere	1,5   Boxer + 0,2   Topik
Væselhale	
Væselhale St. 09-11	0,5   Mateno Duo + 1,5   Boxer
Opfølgning	0,75   Atlantis ultimo oktober efter behov
2-delt strategi ved tidlig såning og for høj temperatur til Boxer (prosulfocarb)	
St. 0-11	0,5   Mateno Duo
Midt i oktober	1,0   Boxer + 0,75   Atlantis

## Rug og vinterbyg:

Standardløsning ved lavt til moderat ukrudtstryk	
Alm. ukrudtsbestand: st. 10-11 (kørespor netop synlige)	1,0   Boxer + 0,05   DFF
Stor ukrudtsbestand St. 11 – kørespor skal være synlige Opfølges 10-14 dage senere med	0,35   Mateno Duo* 1   Boxer*
Vinterbyg med meget græsukrudt St. 09-11	2,5   Boxer + 0,05   DFF

\* Mateno Duo og Boxer må ikke Blandes i Rug og vinterbyg

## Skadedyr:

Tidlig såning kan give angreb af bladlus, som kan overføre havrerødsot til vintersæden. Risikoen er størst ved lunt vejr

Pas også på snegle. Fremmes af fugtige forhold, og der ses ofte angreb efter gode forfrugter (raps, frøgræs m.f). Vær især opmærksom i kanter og knoldede områder af markerne.

Skadedyr i vintersæd	
Agersnegle	3-4 kg/ha Ferrex 4-5 kg/ha Sluxx HP
Bladlus	0,15 kg/ha Lamdex 0,075 kh/ha Kaiso Sorbie